



LIETUVOS ALERGOLOGŲ IR KLINIKINIŲ IMUNOLOGŲ DRAUGIJA

Asociacija, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, tel. +370 686 75139, el.p. jstaikuniene@gmail.com; info@alergologudraugija.lt;
Juridinių asmenų registro kodas 191615844, sąsk.Nr. LT 347044060001324603

Lietuvos Alergologų ir klinikinių imunologų draugijos rekomendacijos:

Alergiškų asmenų skiepijimas COVID-19m RNR vakcina „Comirnaty“

Vis plačiau taikant Lietuvoje vakcinaciją prieš COVID-19 ligą, sveikatos priežiūros specialistams tenka spręsti problemą dėl alergiškų žmonių skiepijimo. Šiandien kas trečias žmogus patiria alerginių reakcijų, tačiau jų dauguma gali būti saugiai skiepijami. Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, kuri vienija Lietuvos alergologus ir klinikinius imunologus bei kitų sričių specialistus, besidominčius alergologijos ir imunologijos problemomis, pateikia rekomendacijas kaip skiepyti alergiškus žmones COVID-19 mRNR vakcina „Comirnaty“ (gamintojas Pfizer-BioNtech):

1. “Comirnaty” vakcina **GALIMA** skiepyti be gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo konsultacijos, jei yra:
 - Alergija maistui, kai nebuvo sunkios išplitusios alerginės reakcijos - **anafilaksijos**. Alergija maistui nėra kontraindikacija vakcinai. Gamintojai teigia, kad vakcinoje ar jos gaminimo procese nenaudojamas glitimas, soja, kiaušinis. Ankstyvose vakcinos gaminimo stadijose naudojami karvės pieno komponentai.
 - Alergija vaistams, kai yra lengvos ir vidutinio sunkumo alerginės reakcijos į medikamentus ir nebuvo anafilaksijos. Alergija penicilinų ar kitų grupių antibiotikams nėra kontraindikacija skiepytis “Comirnaty” vakcina.
 - Alergiški lateksui. Gamintojas teigia, kad guminio dangtelio sudėtyje latekso **nėra**. Alergiški lateksui turėtų įspėti medicinos personalą, nes lateksas gali būti naudojamas skiepijimo metu (pvz. slaugytojo naudojamos latekso pirštinės).
2. “Comirnaty” vakcina **NEGALIMA** skiepyti, jei po pirmos “Comirnaty” vakcinos dozės pasireiškė alerginė reakcija.
3. “Comirnaty” vakcina skiepyti **REKOMENDUOJAMA tik po gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo konsultacijos** dėl skiepo atlikimo galimybės ir sąlygų:
 - Jei praityje po vakcinos, medikamento ar maisto buvo sunki išplitusi alerginė reakcija, anafilaksija;
 - Jei nustatyta alergija polietilenglikoliui (PEG), kuris yra vakcinos sudedamoji dalis. Ši medžiaga dažnai naudojama medikamentų gamyboje, kosmetikoje. Patyrę lengvesnius PEG sukeltus alergijos simptomus, gali būti skiepijami alergologo priežiūroje. Tiems, kam PEG sukėlė sunkesnę alergiją, rekomenduojama palaukti kitų gamintojų vakcinų, kurių sudėtyje nėra PEG.

Įprastai specialaus pasiruošimo prieš “Comirnaty” vakciną nereikia, dėl galimos anafilaksijos rizikos po skiepo visiems privalomas stebėjimas 15 - 20 minučių.

Šios rekomendacijos patvirtintos 2021m. sausio 05d. Lietuvos Alergologų ir klinikinių imunologų draugijos Valdybos posėdyje, protokolo numeris 01/20210105.

Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugijos pirmininkė

Doc. Dr. Jūratė Staikūnienė

